



สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสำคัญสูง และโรคไข้เลือดออก
จังหวัดอุบลราชธานี
สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2569
(1 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2569)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ที่มีความสำคัญสูง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2569



โรค / ภัยสุขภาพ	พ.ศ. 2568 (ทั้งปี)			พ.ศ. 2569 (วันที่ 1 ม.ค. – 22 ก.พ. 2569)			
	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย CFR (%)	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วย ต่อ ปกก. แสนคน	อัตราป่วยตาย CFR (%)
1. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)	34,518	7	0.02	4,919	1	246.93	0.02
2. ปอดอักเสบ (Pneumonia)	20,450	99	0.48	3,000	-	161.58	0.00
3. โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)	11,263	-	0.00	2,084	-	112.24	0.00
4. โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)	3,400	-	0.00	122	-	6.67	0.00
5. โรคmelioidosis (Meliodosis)	330	4	1.21	41	-	2.21	0.00
6. ไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS)	1,893	1	0.05	28	-	1.51	0.00
7. โรคฉี่หนู (Leptospirosis)	158	4	2.53	20	-	1.08	0.00
8. โควิด 19 (Covid 19)	5,783	1	0.02	12	-	0.65	0.00
9. เห็ดพิษ (Mushroom Poisoning)	1,080	2	0.19	7	-	0.38	0.00
10. ไข้มาลาเรีย (Malaria)	4	-	0.00	0	-	0.00	0.00

ที่มา: รง. DDS (D506) กองระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2569 ประจำสัปดาห์ที่ 9

สถานการณ์ ระดับประเทศ

สถานการณ์โรคไข้เลือด
ออกย้อนหลัง



2569 **2568** **2567** **2566** **2565** **2564**




ป่วย
(ราย)

2,995 5,591 20,162 8,464 1,021 1,956

อัตราป่วย
(/100,000 ปชก.)

4.63 46.33 172.63 68.27 9.61 16.40



ตาย
(ราย)

1 9 24 11 3 2

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ)

0.03 1.32 0.58 0.54 2.51 0.59

จำนวนผู้ป่วย พ.ศ.2569 **น้อยกว่า** พ.ศ.2568 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ประมาณ **2** เท่า



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 25 ก.พ. 69

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย	2,995	ราย
อัตราป่วย	4.63	/100,000 ปชก.
ตายสะสม	1	ราย
อัตราป่วยตาย	0.03	ร้อยละ

ป่วย **+371** ราย
ตาย **+0** ราย




เพศชาย : เพศหญิง
1:1

เพศ	จำนวน ...	ร้อยละ
ชาย	1,597	53.3%
หญิง	1,398	46.7%


อาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ไม่ระบุ	2,649	88.45%
รับจ้าง	91	3.04%
นักเรียน/นักศึกษา	91	3.04%
ในปกครอง	52	1.74%
ว่างงาน	32	1.07%
อื่นๆ	26	0.87%

AGE	มากที่สุด (ปี)	มัธยฐาน (ปี)	น้อยสุด (ปี)
	93	26	0

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอาการ



สัดส่วนผู้ป่วย IPD และ OPD



กลุ่มอายุ	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	153	5.95	0	0.00
5-9 ปี	242	7.29	0	0.00
10-14 ปี	422	10.98	0	0.00
15-19 ปี	313	7.90	0	0.00
20-29 ปี	613	7.05	0	0.00
30-39 ปี	514	5.58	1	0.19
40-49 ปี	311	3.12	0	0.00
50-59 ปี	187	1.88	0	0.00
60 ปีขึ้นไป	240	1.81	0	0.00
รวม	2,995	4.63	1	0.03

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค พ.ศ. 2569

ภาค	ป่วย(ราย)	อัตราป่วย	ตาย(ราย)	อัตราป่วยตาย
ภาคใต้	983	10.44	0	0.00
กรุงเทพฯ	535	10.07	1	0.19
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	1,038	4.70	0	0.00
ภาคเหนือ	217	1.86	0	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	222	1.03	0	0.00

[สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต](#)

หมายเหตุ: อัปเดตข้อมูลจำนวนผู้ป่วยทุกวันพุธของทุกสัปดาห์



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต พ.ศ. 2569

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

3

ราย

เสียชีวิตสะสม



มีใน D506 แล้ว 1 ราย

0.11

ร้อยละ

อัตราป่วยตาย



ชาย 2

ราย



หญิง 1

ราย

อัตราส่วนเพศชาย:หญิง = 2:1



น้อยที่สุด 35 ปี



มัธยฐาน 46 ปี

มากที่สุด 47 ปี

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	153	5.95	0.00	0.00
5-9 ปี	242	7.29	0.00	0.00
10-14 ปี	422	10.98	0.00	0.00
15-19 ปี	313	7.9	0.00	0.00
20-29 ปี	613	7.05	0.00	0.00
30-39 ปี	514	5.58	1.00	0.19
40-49 ปี	311	3.12	2.00	0.64
50-59 ปี	187	1.88	0.00	0.00
60 ปีขึ้นไป	240	1.81	0.00	0.00



สถานการณ์โรคไขเลือดออกเสียชีวิต พ.ศ. 2569

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

3

จังหวัดที่มีรายงานผู้เสียชีวิต

เขต ▾

ภาค ▾




จำนวน



อัตราป่วยตาย

จำนวนผู้ป่วยไขเลือดออกเสียชีวิตรายสัปดาห์ พ.ศ. 2569



ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) และโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อฯ โดยแมลง กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dhfvbd@gmail.com




สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต พ.ศ. 2569

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)
1. Positive	1
2. Positive แต่ไม่ทราบผล s...	0
3. อยู่ระหว่างรอผลตรวจ	1
4. Negative	1
5. ไม่ได้ส่งตรวจ	0



ภาค ▾


- DENV-1
- DENV-2
- DENV-3
- DENV-4



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

อัตราป่วยสะสมสูงสุด 16 อันดับแรกของประเทศ

ระดับพื้นที่ ▾ ภาค ▾ เขต ▾ จังหวัด ▾




ภาค	เขต	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยสะสม ▾	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วยตายสะสม (ร้อยละ)	อัตราป่วยตาย 4 สัปดาห์ (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ (ต่อประชากรแสนคน)	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)
ใต้	11	ภูเก็ต	209	50.43	0	0.00	0	80	19.3	0
กลาง	5	สมุทรสาคร	133	23.66	0	0.00	0	65	11.56	0
ใต้	12	สงขลา	228	16.10	0	0.00	0	102	7.2	0
กลาง	6	สมุทรปราการ	208	15.37	0	0.00	0	87	6.43	0
ใต้	12	ตรัง	97	15.32	0	0.00	0	44	6.95	0
ใต้	12	สตูล	39	12.06	0	0.00	0	21	6.5	0
กลาง	6	ตราด	25	11.55	0	0.00	0	7	3.23	0
กลาง	5	นครปฐม	97	10.65	0	0.00	0	37	4.06	0
กรุงเทพฯ	13	กรุงเทพมหานคร	535	10.07	1	0.19	0	225	4.23	0
ใต้	11	พังงา	26	9.91	0	0.00	0	13	4.95	0
กลาง	4	นนทบุรี	125	9.72	0	0.00	0	58	4.51	0
ใต้	11	สุราษฎร์ธานี	100	9.42	0	0.00	0	56	5.28	0
ใต้	12	พัทลุง	37	7.14	0	0.00	0	13	2.51	0
กลาง	6	ชลบุรี	113	7.10	0	0.00	0	56	3.52	0
ใต้	11	ระนอง	12	6.69	0	0.00	0	7	3.9	0
ใต้	11	นครศรีธรรมราช	98	6.41	0	0.00	0	48	3.14	0

จังหวัดอุบลราชธานี
อัตราป่วยสะสมลำดับที่ 45
ของประเทศ
(ไม่อยู่ในตาราง)



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ระดับพื้นที่ ภาค เขต จังหวัด

ภาค	เขต	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยสะสม	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วยตายสะสม (ร้อยละ)	อัตราป่วยตาย 4 สัปดาห์ (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ (ต่อประชากรแสนคน)	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)
กลาง	4	สงขลา	4	2.00	0	0.00	0	3	1.5	0
เหนือ	1	พะเยา	9	1.99	0	0.00	0	6	1.32	0
กลาง	6	สระแก้ว	11	1.98	0	0.00	0	5	0.9	0
ตะวันออกเจี...	7	มหาสารคาม	18	1.93	0	0.00	0	9	0.97	0
กลาง	4	พิจิตรศรี...	15	1.84	0	0.00	0	4	0.45	0
ตะวันออกเจี...	10	อุบลราชธานี	34	1.83	0	0.00	0	25	1.35	0
ตะวันออกเจี...	8	นครพนม	13	1.83	0	0.00	0	4	0.56	0
เหนือ	8	อุทัยธานี	8	1.83	0	0.00	0	3	0.94	0
เหนือ	8	อุตรดิตถ์	8	1.83	0	0.00	0	3	0.94	0
กลาง	4	สุโขทัย	8	1.83	0	0.00	0	3	0.94	0
กลาง	4	สุพรรณบุรี	8	1.83	0	0.00	0	3	0.94	0
ตะวันออกเจี...	7	ร้อยเอ็ด	16	1.25	0	0.00	0	7	0.55	0
ตะวันออกเจี...	8	หนองบัวลำภ	6	1.19	0	0.00	0	2	0.4	0
ใต้	11	ชุมพร	7	1.39	0	0.00	0	1	0.2	0
ตะวันออกเจี...	9	นครราชสีมา	36	1.38	0	0.00	0	23	0.88	0
เหนือ	3	นครสวรรค์	13	1.28	0	0.00	0	6	0.59	0
ตะวันออกเจี...	7	ร้อยเอ็ด	16	1.25	0	0.00	0	7	0.55	0
ตะวันออกเจี...	8	หนองบัวลำภ	6	1.19	0	0.00	0	2	0.4	0

สัปดาห์ที่ 5 : จังหวัดอุบลราชธานี อัตราป่วยสะสมลำดับที่ 45 ของประเทศ
ป่วยสะสม 34 ราย อัตราป่วยสะสม 1.83

อัตราป่วย สะสม (ต่อ...
1.83

[ดาวน์โหลดรายชื่ออำเภอขนาดใหญ่](#)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
เปรียบเทียบตามช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 5 ปี
สัปดาห์ที่ 9

	2569 *	2568	2567	2566	2565	2564
ป่วย (ราย)	34	1,893	2,151	2,527	535	1,709
อัตราป่วย (ต่อแสน)	1.83	102.04	115.17	135.30	28.51	91.07
เสียชีวิต (ราย)	0	0	0	0	0	0
อัตรามตาย (ร้อยละ)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกรายอำเภอ ปี 2569

สัปดาห์ที่ 9

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ตาย	อัตราป่วยตาย	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด	อัตราป่วยตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด
1	โพธิ์ไทร	16	35.81	0	0	11	24.62	0	0
2	ตาลชุม	2	6.03	0	0	2	6.03	0	0
3	นาเยียบ	1	3.64	0	0	1	3.64	0	0
4	เดชอุดม	6	3.37	0	0	5	2.81	0	0
5	กุดข้าวปุ้น	1	2.44	0	0	1	2.44	0	0
6	วารินชำราบ	3	1.87	0	0	1	0.62	0	0
7	สำโรง	1	1.85	0	0	1	1.85	0	0
8	น้ำยืน	1	1.42	0	0	0	0.00	0	0
9	เมืองอุบลราชธานี	2	0.89	0	0	2	0.89	0	0
10	ตระการพิชัย	1	0.82	0	0	1	0.82	0	0
11	ศรีเมืองใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0
12	เขื่องใน	0	0	0	0	0	0	0	0
13	พิบูลมังสาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0

ที่มา : กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ จังหวัดอุบลราชธานี



อัตราป่วยมากกว่า 50.0 /แสนประชากร

อัตราป่วย 25.0 - 49.9 /แสนประชากร



อัตราป่วย 0.1 - 24.9 /แสนประชากร

ไม่มีผู้ป่วย





ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกรายอำเภอ ปี 2569



สัปดาห์ที่ 9

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ตาย	อัตราป่วยตาย	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด	อัตราป่วยตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด
14	นาคะหวาย	0	0	0	0	0	0	0	0
15	สว่างวีระวงศ์	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ม่วงสามสิบ	0	0	0	0	0	0	0	0
17	สิรินธร	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ดอนมดแดง	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ทุ่งศรีอุดม	0	0	0	0	0	0	0	0
20	เหล่าเสือโก้ก	0	0	0	0	0	0	0	0
21	บุญทรिक	0	0	0	0	0	0	0	0
22	เขมรราชู	0	0	0	0	0	0	0	0
23	นาตาล	0	0	0	0	0	0	0	0
24	โขงเจียม	0	0	0	0	0	0	0	0
25	น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0

ที่มา : กองโรคติดต่อหน้าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 อัตราป่วยมากกว่า 50.0 /แสนประชากร
 อัตราป่วย 25.0 - 49.9 /แสนประชากร

 อัตราป่วย 0.1 - 24.9 /แสนประชากร
 ไม่มีผู้ป่วย



แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.อุบลราชธานี ปี 2569

1. ทุกหมู่บ้าน, ชุมชน และหน่วยงานทุกแห่ง มีกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน (ทุกวันศุกร์) และ อสม.รายงานผ่าน Smart อสม.
2. หากมีไข้ 2 วัน ไม่ดีขึ้น ส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลจัดตั้ง Dengue Check Point, ใช้ Rapid test Ns1 Antigen ช่วยวินิจฉัย, ถ่ายสารทากันยุง และ Admit ผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกราย (ตามกรณีจำเป็น)
5. sw.สต.เริ่มใช้ Rapid test Ns1 Antigen ช่วยวินิจฉัย
6. งดยา NSAIDs ในผู้ป่วยมีไข้ทุกกรณี ทั้ง sw./ คลินิก/ ร้านขายยา/คลินิกชุมชนอบอุ่น
7. อบต./ เทศบาลทุกแห่ง ให้จัดหาเคมีภัณฑ์ น้ำมัน จัดทีมพ่นเคมีให้เพียงพอ สามารถควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ได้ตลอดทั้งปี และวางแผนงานรับภาระระบาดในปี 2569
8. เปิด EOC หากมีการระบาดมากกว่า 25% ของพื้นที่



5 ป. ปราศจากยุงลาย



ปิดฝาภาชนะ
ให้สนิท



ปล่อยปลา
กินลูกน้ำ



เปลี่ยนน้ำ
ที่ปิดภาชนะที่ไม่ได้ใช้



ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์



ปฏิบัติเป็น
ประจำ ป้องกัน
ยุงลายไม่ให้กัด

2 ข. 1 กำจัดขยะ 2 ชัดไข่ยุงลาย



สำรวจลูกน้ำ "ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะหมดหน้าฝน"

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทรี่แดง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ขอเชิญชวน

ชาวอุบลราชธานี

ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3 เก็บ 3 โรค

โรคไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

✓ เก็บบ้าน



✓ เก็บขยะ



✓ เก็บน้ำ



เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ไซซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย
สำรวจลูกน้ำ "ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะหมดหน้าฝน"



นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทรแดง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



คำแนะนำสำหรับ การป้องกัน ไข้เลือดออก



ระวังการจ่ายยา กลุ่ม NSAIDs
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการไข้



หากมีอาการไข้สูงลอย นานเกิน 2 วัน
มีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์
งดการรับประทานยา กลุ่ม NSAIDs
และ ไม่ควรซื้อยากินเอง



ยา กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs)
คือยาบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีผลข้างเคียง
อาจทำให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
เลือดออกและเป็นแผลในทางเดินอาหาร
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ เช่น
ยาไอบูโพรเฟน ยาไดโครฟีแนค
ยาแอสไพริน ยาไพริ็อกซิแคม
เป็นยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดย
แพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น



ผู้ป่วยและผู้อยู่ร่วมบ้าน ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด
เนื่องจากยุงสามารถแพร่เชื้อได้
ควรงดนอนในมุ้ง / สวมเสื้อผ้ามิดชิด / ทายากันยุง



สถานพยาบาลจ่ายยากันยุงให้ผู้ป่วย
โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย (ไข้เลือดออก / ไข้ซิกา / ไข้ปวดข้อยุงลาย)
ให้ผู้ป่วยใช้ต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 5-7 วัน



หมั่นสำรวจและทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน
ขัดขอบภาชนะ จัดการขยะยุงลาย





กรมควบคุมโรค

มาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่

ควบคุม

3-3-1

โรคติดต่อ
นำโดยยุงลาย

มาตรการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วย โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

เมื่อได้รับแจ้ง

ควรดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทันที
ตามมาตรการ 3-3-1 และเฝ้าระวัง
โรคต่อเนื่อง 28 วัน ดังนี้



3

สถานพยาบาลแจ้ง รพ.สต. หรือสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ที่ทราบว่ามีผู้ป่วย
โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ภายใน 3 ชั่วโมง
หลังผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย

3

รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุข
ดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมยุงพาหะ
โดยการฉีดพ่นสารเคมี (เช่น สเปรย์กระพอง)
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย
ภายใน 3 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย



1

หน่วยงานท้องถิ่น พ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย
ภายใน 1 วัน หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย



Thank You